



PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6 : C07D 493/04, 417/06, 413/06, 277/24		A2	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO/99/65913
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/04244		(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 23. Dezember 1999 (23.12.99)	
(22) Internationales Anmeldedatum: 18. Juni 1999 (18.06.99)		(81) Bestimmungsstaaten: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).	
(30) Prioritätsdaten: 198 26 988.9 18. Juni 1998 (18.06.98) DE		Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i>	
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): GESELLSCHAFT FÜR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG MBH (GBF) [DE/DE]; Mascheroder Weg 1, D-38124 Braunschweig (DE).			
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HOEFLE, Gerhard [DE/DE]; Mascheroder Weg 1, D-38124 Braunschweig (DE). REICHENBACH, Hans [DE/DE]; Mascheroder Weg 1, D-38124 Braunschweig (DE). GERTH, Klaus [DE/DE]; Mascheroder Weg 1, D-38124 Braunschweig (DE). HARDT, Ingo [DE/DE]; Mascheroder Weg 1, D-38124 Braunschweig (DE). SASSE, Florenz [DE/DE]; Mascheroder Weg 1, D-38124 Braunschweig (DE). STEINMETZ, Heinrich [DE/DE]; Mascheroder Weg 1, D-38124 Braunschweig (DE).			
(74) Anwälte: BOETERS, Hans usw.; Boeters & Bauer, Berater 15, D-81541 München (DE).			
(54) Title: EPOTHILONE MINOR CONSTITUENTS			
(54) Bezeichnung: EPOTHILON-NEBENKOMPONENTEN			
(57) Abstract The invention relates to compounds which are obtained by fermenting DSM 6773, especially epothilones A1, A2, A8, A9, B10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, D1, D2, D5, G1, G2, H1, H2, I1, I2, I3, I4, I5, I6 and K and trans-epothilones C1 and C2.			
(57) Zusammenfassung Die Erfindung betrifft Verbindungen, die durch Fermentation von DSM 6773 erhältlich sind, insbesondere Epothilone A1, A2, A8, A9, B10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, D1, D2, D5, G1, G2, H1, H2, I1, I2, I3, I4, I5, I6 und K und Trans-Epothilone C1 und C2.			

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						









Epothilon-Nebenkomponenten





Die Erfindung betrifft Verbindungen, die im vorliegenden Zusammenhang als Epothilon-Nebenkomponenten bezeichnet werden, und zwar Verbindungen 5 bis 13 und 16 bis 39. Diese Verbindungen lassen sich durch Fermentation von DSM 6773 gemäß DE 41 38 042.8 gewinnen.

Kenndaten der erfindungsgemäßen Verbindungen sind im folgenden zusammengestellt.


Gewinnung: Die Aufarbeitung eines Rohepothilon-Gemischs, das durch Fermentation von DSM 6773 in einem 900 Liter-Fermentator gewonnen wurde, ist schematisch Fig. 1 bis 2 zu entnehmen.

Aktivitäten: vgl. Tab. 1


Epothilone A (1) $R^1 = H$; $R = H$ Epothilone B (2) $R^1 = H$; $R = Me$ Epothilone E (3) $R^1 = OH$; $R = H$ Epothilone F (4) $R^1 = OH$; $R = Me$ Epothilone A₁ (5) $R^1 = H$; $R^2, R^8 = Me$ Epothilone A₂ (6) $R^2 = H$; $R^1, R^8 = Me$ Epothilone A₈ (7) $R^8 = H$; $R^1, R^2 = Me$ Epothilone A₉ (8) $R^1 = CH_2OH$; $R^2, R^8 = Me$ Epothilone B₁₀ (9)Epothilone G₁ (10) $R = H$ Epothilone G₂ (11) $R = Me$ Epothilone H₁ (12) $R = H$ Epothilone H₂ (13) $R = Me$ Epothilone C (14) $R^1, R^2, R^3, R^4 = Me$; $R = H$ Epothilone D (15) $R^1, R^2, R^3, R^4, R = Me$ Epothilone C₁ (16) $R^1 = H$; $R^2, R^3, R^4 = Me$; $R = H$ Epothilone D₁ (17) $R^1 = H$; $R^2, R^3, R^4 = Me$; $R = Me$ Epothilone C₂ (18) $R^2 = H$; $R^1, R^3, R^4 = Me$; $R = H$ Epothilone D₂ (19) $R^2 = H$; $R^1, R^3, R^4 = Me$; $R = Me$ Epothilone C₃ (20) $R^3 = H$; $R^1, R^2, R^4 = Me$; $R = H$ Epothilone C₄ (21) $R^4 = H$; $R^1, R^2, R^3 = Me$; $R = H$ Epothilone C₅ (22) $R = H$ Epothilone D₅ (23) $R = Me$ Epothilone C₆ (24)

Epothilone C₇ (25) R⁷ = OH; R⁸ = MeEpothilone C₈ (26) R⁸, R⁷ = HEpothilone C₉ (27) R⁸ = CH₂OH; R⁷ = Htrans-Epothilone C₁ (28) R¹ = H; R² = Metrans-Epothilone C₂ (29) R² = H; R¹ = MeEpothilone I₁ (30) R, R³ = H; R¹, R² = MeEpothilone I₂ (31) R = H; R¹, R², R³ = MeEpothilone I₃ (32) R¹, R², R³, R = MeEpothilone I₄ (33) R², R = H; R¹, R³ = MeEpothilone I₅ (34) R² = H; R¹, R³, R = MeEpothilone I₆ (35) R¹ = H; R², R³, R = Me

Epothilone K (36)



(37)



(38) R = H

(39) R = Me

Epothilone A₁ (5): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -69 (c 0.1, MeOH); UV (MeOH) λ_{\max} nm (ϵ) 208 (19600), 247 (13600); IR (KBr) ν_{\max} 3437, 2959, 2931, 2876, 1732, 1710, 1455, 1259, 978 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 6.95 (1H, s, H-19), 6.60 (1H, bs, H-17), 5.68 (1H, dd, J = 4.4, 4.0 Hz, H-15), 4.12 (1H, m, H-3), 3.71 (1H, m, H-7), 3.52 (1H, bs, 7-OH), 3.37 (1H, bd, J = 7.5 Hz, 3-OH), 3.21 (1H, dq, J = 7.7, 7.0 Hz, H-4), 3.02 (1H, ddd, J = 9.2, 4.5, 2.8 Hz, H-13), 2.87 (1H, ddd, J = 8.3, 4.5, 3.7 Hz, H-12), 2.78 (1H, dd, J = 16.8, 4.3 Hz, H-2a), 2.70 (3H, s, H-21), 2.66 (1H, dq, J = 3.9, 7.0 Hz, H-6), 2.65 (1H, dd, J = 16.8, 5.2 Hz, H-2b), 2.16 (1H, ddd, J = 15.4, 4.4, 2.8 Hz, H-14a), 2.12 (3H, bs, H-27), 1.91 (1H, ddd, J = 15.4, 9.2, 4.0 Hz, H-14b), 1.63 (1H, m, H-10a), 1.62 (2H, m, H-11), 1.59 (1H, m, H-9a), 1.52 (1H, m, H-10b), 1.39 (1H, m, H-8), 1.35 (1H, m, H-9b), 1.211 (3H, d, J = 7.0 Hz, H-23), 1.207 (3H, d, J = 7.0 Hz, H-24), 0.89 (3H, d, J = 6.9 Hz, H-25); EIMS m/z 479 $[\text{M}]^+$ (21), 322 (31), 306 (65), 304 (47), 168 (45), 166 (73), 164 (100), 151 (30), 140 (35); HREIMS m/z 479.2317 (calcd. for $\text{C}_{27}\text{H}_{41}\text{NO}_5\text{S}$, 479.2342).

Epothilone A₂ (6): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ +12.0 (c 1.0, MeOH); UV (MeOH) λ_{\max} nm (ϵ) 210 (15100), 248 (15500); IR (KBr) ν_{\max} 3438, 2963, 2929, 2875, 1734, 1706, 1458, 1262, 981 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 6.98 (1H, s, H-19), 6.63 (1H, bs, H-17), 5.40 (1H, dd, J = 8.3, 3.4 Hz, H-15), 4.26 (1H, ddd, J = 8.5, 4.8, 4.7 Hz, H-3), 3.85 (1H, dd, J = 7.9,

2.6 Hz, H-7), 3.54 (1H, bs, 3-OH), 3.09 (1H, dq, $J = 4.8$, 7.0 Hz, H-4), 3.01 (1H, ddd, $J = 8.3$, 4.8, 4.6 Hz, H-13), 2.98 (1H, dq, $J = 7.9$, 7.0 Hz, H-6), 2.89 (1H, ddd, $J = 6.7$, 4.6, 4.4 Hz, H-12), 2.68 (3H, s, H-21), 2.60 (1H, dd, $J = 15.1$, 8.5 Hz, H-2a), 2.52 (1H, bs, 7-OH), 2.50 (1H, dd, $J = 15.1$, 4.7 Hz, H-2b), 2.18 (1H, ddd, $J = 15.0$, 4.8, 3.4 Hz, H-14a), 2.11 (3H, d, $J = 1.3$ Hz, H-27), 1.82 (1H, ddd, $J = 15.0$, 8.3, 8.1 Hz, H-14b), 1.63 (1H, m, H-8), 1.61 (2H, m, H-11a and H-10a), 1.46 (1H, m, H-11b), 1.39 (2H, m, H-9), 1.31 (1H, m, H-10b), 1.22 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-24), 1.15 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-22), 1.01 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-25); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ 216.2 (s, C-5), 170.1 (s, C-1), 164.9 (s, C-20), 152.0 (s, C-18), 137.0 (s, C-16), 120.3 (d, C-17), 116.5 (d, C-19), 76.7 (d, C-15), 75.6 (d, C-7), 69.1 (d, C-3), 57.1 (d, C-12), 54.3 (d, C-13), 50.3 (d, C-4), 49.6 (d, C-6), 39.4 (t, C-2), 35.5 (d, C-8), 32.2 (t, C-14), 29.6 (t, C-9), 27.6 (t, C-11), 23.9 (t, C-10), 19.2 (q, C-21), 18.0 (q, C-25), 15.6 (q, C-27), 13.9 (q, C-24), 12.4 (q, C-22); EIMS m/z 479 $[\text{M}]^+$ (18), 322 (38), 306 (78), 304 (59), 168 (48), 166 (96), 164 (100), 151 (33), 140 (38); HREIMS m/z 479.2318 (calcd. for $\text{C}_{27}\text{H}_{41}\text{NO}_5\text{S}$, 479.2342).

Epothilone A₃ (7): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22} -76.2$ (c 1.0, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 210 (15300), 248 (15500); IR (KBr) ν_{max} 3440, 2967, 2932, 2876, 1736, 1691, 1467, 1252, 979 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 6.95 (1H, s, H-19), 6.64 (1H, dd, $J = 15.6$, 0.9 Hz, H-17), 6.52 (1H, dd, $J = 15.6$, 6.6 Hz, H-16), 5.68 (1H, dddd, $J = 7.8$, 6.6, 3.2, 0.9 Hz, H-15), 4.11 (1H, ddd, $J = 10.1$, 6.6, 3.5 Hz, H-3), 3.78 (1H, ddd, $J = 5.2$, 3.2, 3.2 Hz, H-7), 3.66 (1H, d, $J = 6.6$ Hz, 3-OH), 3.23 (1H, dq, $J = 5.2$, 6.9 Hz, H-6), 3.08 (1H, ddd, $J = 7.3$, 5.5, 4.1 Hz, H-13), 2.90 (1H, ddd, $J = 6.6$, 4.6, 4.1 Hz, H-12), 2.69 (3H, s, H-21), 2.52 (1H, dd, $J = 14.7$, 10.1 Hz, H-2a), 2.44 (1H, bd, $J = 3.2$ Hz, 7-OH), 2.41 (1H, dd, $J = 14.7$, 3.5 Hz, H-2b), 2.10

(1H, ddd, $J = 15.0, 5.5, 3.2$ Hz, H-14a), 1.90 (1H, ddd, $J = 15.0, 7.8, 7.3$ Hz, H-14b), 1.71 (1H, m, H-8), 1.65 (1H, m, H-11a), 1.50 (1H, m, H-10a), 1.47 (1H, m, H-11b), 1.40 (2H, m, H-9), 1.39 (1H, m, H-10b), 1.33 (3H, s, H-23), 1.16 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-24), 1.08 (3H, s, H-22), 0.98 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-25); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ 220.3 (s, C-5), 170.7 (s, C-1), 166.5 (s, C-20), 152.2 (s, C-18), 128.4 (d, C-16), 125.9 (d, C-17), 116.4 (d, C-19), 75.0 (d, C-7), 73.6 (d, C-3), 72.7 (d, C-15), 57.3 (d, C-12), 54.1 (d, C-13), 52.6 (s, C-4), 43.8 (d, C-6), 38.9 (t, C-2), 36.3 (d, C-8), 32.5 (t, C-14), 30.3 (t, C-9), 26.7 (t, C-11), 24.0 (t, C-10), 21.3 (q, C-23), 21.0 (q, C-22), 19.3 (q, C-21), 17.1 (q, C-25), 14.5 (q, C-24); EIMS m/z 479 $[\text{M}]^+$ XXX; HRDCIMS m/z 480.2401 (calcd. for $\text{C}_{25}\text{H}_{38}\text{NO}_6\text{S}$, 480.2401).

Epothilone A₉ (8): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22} -37.6$ (c 0.5, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 211 (15500), 253 (14100); IR (KBr) ν_{max} 3423, 2965, 2932, 2877, 1736, 1690, 1463, 1249, 1014, 979 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 7.10 (1H, s, H-19), 6.72 (1H, dd, $J = 10.7, 4.3$ Hz, 27-OH), 6.60 (1H, bs, H-17), 5.69 (1H, dd, $J = 11.6, 2.0$ Hz, H-15), 5.59 (1H, d, $J = 6.6$ Hz, 3-OH), 4.49 (1H, ddd, $J = 12.9, 4.3, 1.2$ Hz, H-27a), 4.27 (1H, ddd, $J = 11.6, 6.6, 2.9$ Hz, H-3), 4.11 (1H, ddd, $J = 12.9, 10.7, 1.0$ Hz, H-27b), 3.71 (1H, ddd, $J = 4.8, 3.0, 2.8$ Hz, H-7), 3.17 (1H, dq, $J = 3.0, 6.8$ Hz, H-6), 3.04 (1H, ddd, $J = 9.7, 3.6, 2.2$ Hz, H-13), 2.93 (1H, bs, 7-OH), 2.91 (1H, ddd, $J = 9.7, 3.6, 2.7$ Hz, H-12), 2.72 (3H, s, H-21), 2.48 (1H, dd, $J = 14.2, 11.6$ Hz, H-2a), 2.11 (1H, dd, $J = 14.2, 2.9$ Hz, H-2b), 2.03 (1H, ddd, $J = 14.7, 2.2, 2.0$ Hz, H-14a), 1.86 (1H, m, H-11a), 1.85 (1H, m, H-14b), 1.79 (1H, m, H-8), 1.52 (1H, m, H-10a), 1.37 (3H, m, H-9 and H-10b), 1.37 (3H, s, H-23), 1.36 (1H, m, H-11b), 1.19 (3H, d, $J = 6.8$ Hz, H-24), 1.02 (3H, d, $J = 7.1$ Hz, H-25), 1.00 (3H, s, H-22); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ 220.5 (s, C-5),

170.2 (s, C-1), 167.5 (s, C-20), 150.7 (s, C-18), 138.9 (s, C-16), 125.2 (d, C-17), 119.5 (d, C-19), 76.7 (d, C-15), 73.4 (d, C-7), 70.4 (d, C-3), 57.7 (d, C-12), 57.2 (t, C-27), 55.3 (d, C-13), 54.2 (s, C-4), 41.3 (d, C-6), 40.7 (t, C-2), 37.5 (d, C-8), 31.8 (t, C-14), 31.2 (t, C-9), 28.0 (t, C-11), 23.7 (q, C-23), 23.2 (t, C-10), 19.2 (q, C-21), 16.8 (q, C-22), 15.8 (q, C-25), 13.5 (q, C-24); EIMS m/z 509 $[M]^+$ (9), 491 (4), 322 (28), 321 (25), 180 (45), 167 (40), 166 (100), 165 (49), 154 (47), 138 (33); HREIMS m/z 509.2467 (calcd. for $C_{26}H_{39}NO_7S$, 509.2447).

Epothilone B₁₀ (9): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -27 (c 0.15, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 212 (15800), 247 (12500); IR (KBr) ν_{max} 3434, 2962, 2930, 2876, 2858, 1733, 1692, 1461, 1259, 1052, 981 cm^{-1} ; 1H NMR ($CDCl_3$, 600 MHz) δ 6.99 (1H, s, H-19), 6.60 (1H, bs, H-17), 5.42 (1H, dd, J = 8.0, 3.0 Hz, H-15), 4.25 (1H, ddd, J = 9.5, 6.3, 2.8 Hz, H-3), 4.23 (1H, bs, 3-OH), 3.77 (1H, ddd, J = 4.0, 3.9, 3.8 Hz, H-7), 3.30 (1H, dq, J = 4.0, 6.9 Hz, H-6), 3.01 (2H, q, J = 7.6 Hz, H-21), 2.81 (1H, dd, J = 7.7, 4.6 Hz, H-13), 2.68 (1H, bs, 7-OH), 2.54 (1H, dd, J = 13.9, 9.5 Hz, H-2a), 2.36 (1H, dd, J = 13.9, 2.8 Hz, H-2b), 2.11 (1H, ddd, J = 15.3, 4.6, 3.0 Hz, H-14a), 2.09 (3H, s, H-27), 1.91 (1H, ddd, J = 15.3, 8.0, 7.7 Hz, H-14b), 1.74 (1H, m, H-8), 1.73 (1H, m, H-11a), 1.51 (1H, m, H-10a), 1.41 (1H, m, H-11b), 1.39 (3H, t, J = 7.6 Hz, H-28), 1.38 (3H, m, H-9 and H-10b), 1.37 (3H, s, H-23), 1.28 (3H, s, H-26), 1.17 (3H, d, J = 6.9 Hz, H-24), 1.09 (3H, s, H-22), 1.01 (3H, d, J = 7.0 Hz, H-25); EIMS m/z 521 $[M]^+$ (22), 449 (7), 350 (18), 334 (57), 248 (16), 234 (27), 196 (41), 182 (59), 180 (96), 178 (100), 166 (44), 154 (44); HREIMS m/z 521.2808 (calcd. for $C_{28}H_{43}NO_6S$, 521.2811).

Epothilone G₁ (10): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -39.7 (c 1.0, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 203 (15200), 236 (15100); IR (KBr) ν_{max} 3456, 2962, 2933, 2876, 1736,

1691, 1585, 1466, 1262, 980 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 7.47 (1H, s, H-19), 6.33 (1H, bs, H-17), 5.42 (1H, dd, $J = 8.3, 2.9$ Hz, H-15), 4.11 (1H, ddd, $J = 10.1, 6.1, 3.4$ Hz, H-3), 3.78 (1H, bddd, $J = 5.2, 3.5, 3.5$ Hz, H-7), 3.63 (1H, bd, $J = 6.1$ Hz, 3-OH), 3.21 (1H, dq, $J = 5.2, 7.0$ Hz, H-6), 3.00 (1H, ddd, $J = 7.7, 4.8, 4.2$ Hz, H-13), 2.88 (1H, ddd, $J = 7.1, 4.2, 4.2$ Hz, H-12), 2.53 (1H, dd, $J = 14.8, 10.1$ Hz, H-2a), 2.51 (1H, bd, $J = 3.5$ Hz, 7-OH), 2.43 (1H, dd, $J = 14.8, 3.4$ Hz, H-2b), 2.43 (3H, s, H-21), 2.07 (1H, ddd, $J = 15.1, 4.8, 2.9$ Hz, H-14a), 1.99 (3H, d, $J = 1.3$ Hz, H-27), 1.86 (1H, ddd, $J = 15.1, 8.3, 7.7$ Hz, H-14b), 1.71 (1H, m, H-8), 1.69 (1H, m, H-11a), 1.53 (1H, m, H-10a), 1.42 (1H, m, H-11b), 1.40 (3H, m, H-9 and H-10b), 1.34 (3H, s, H-23), 1.16 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-24), 1.09 (3H, s, H-22), 0.99 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-25); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ 220.1 (s, C-5), 170.5 (s, C-1), 161.0 (s, C-20), 137.4 (s, C-18), 136.7 (s, C-16), 135.9 (d, C-19), 116.4 (d, C-17), 76.4 (d, C-15), 74.9 (d, C-7), 73.7 (d, C-3), 57.4 (d, C-12), 54.4 (d, C-13), 52.6 (s, C-4), 43.8 (d, C-6), 38.8 (t, C-2), 36.2 (d, C-8), 31.4 (t, C-14), 30.4 (t, C-9), 27.0 (t, C-11), 23.9 (t, C-10), 21.3 (q, C-23), 21.2 (q, C-22), 17.2 (q, C-25), 15.8 (q, C-27), 14.4 (q, C-24), 13.8 (q, C-21); EIMS m/z 477 $[\text{M}]^+$ (4), 405 (7), 290 (40), 152 (39), 150 (100), 148 (23), 124 (23); HREIMS m/z 477.2684 (calcd. for $\text{C}_{26}\text{H}_{39}\text{NO}_7$, 477.2727).

Epothilone G₂ (11): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22} -22.6$ (c 1.0, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 202 (21500), 236 (14800); IR (KBr) ν_{max} 3456, 2965, 2934, 2877, 1737, 1690, 1586, 1464, 1250, 980 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 7.48 (1H, s, H-19), 6.33 (1H, bs, H-17), 5.43 (1H, dd, $J = 7.1, 3.6$ Hz, H-15), 4.12 (1H, ddd, $J = 9.9, 6.4, 3.4$ Hz, H-3), 3.77 (1H, ddd, $J = 4.7, 4.4, 4.1$ Hz, H-7), 3.83 (1H, bd, $J = 6.4$ Hz, 3-OH), 3.30 (1H, dq, $J = 4.7, 6.9$

Hz, H-6), 2.78 (1H, dd, $J = 7.0, 5.4$ Hz, H-13), 2.54 (1H, dd, $J = 14.3, 9.9$ Hz, H-2a), 2.51 (1H, bd, $J = 4.1$ Hz, 7-OH), 2.44 (3H, s, H-21), 2.40 (1H, dd, $J = 14.3, 3.4$ Hz, H-2b), 2.03 (1H, ddd, $J = 15.2, 5.4, 3.6$ Hz, H-14a), 2.00 (3H, d, $J = 1.3$ Hz, H-27), 1.92 (1H, ddd, $J = 15.1, 7.1, 7.0$ Hz, H-14b), 1.71 (1H, m, H-8), 1.68 (1H, m, H-11a), 1.51 (1H, m, H-10a), 1.42 (1H, m, H-11b), 1.39 (3H, m, H-9 and H-10b), 1.35 (3H, s, H-23), 1.26 (3H, s, H-26), 1.16 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-24), 1.07 (3H, s, H-22), 0.99 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-25); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ 220.7 (s, C-5), 170.5 (s, C-1), 161.0 (s, C-20), 137.4 (s, C-18), 136.5 (s, C-16), 135.9 (d, C-19), 116.3 (d, C-17), 76.6 (d, C-15), 74.6 (d, C-7), 73.5 (d, C-3), 61.3 (s, C-12), 61.1 (d, C-13), 52.7 (s, C-4), 43.4 (d, C-6), 39.0 (t, C-2), 36.5 (d, C-8), 32.0 (t, C-11), 31.8 (t, C-14), 30.8 (t, C-9), 22.8 (t, C-10), 22.9 (q, C-26), 21.0 (q, C-23), 20.8 (q, C-22), 17.2 (q, C-25), 15.9 (q, C-27), 14.1 (q, C-24), 13.8 (q, C-21); EIMS m/z 491 $[M]^+$ (21), 419 (6), 320 (18), 304 (39), 166 (42), 152 (57), 150 (100), 149 (44), 148 (58), 124 (35), 109 (33); HREIMS m/z 491.2878 (calcd. for $\text{C}_{27}\text{H}_{41}\text{NO}_7$, 491.2883).

Epithilone H₁ (12): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22} -84.2$ (c 0.2, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 203 (19600), 237 (12000); IR (KBr) ν_{max} 3436, 2933, 2880, 2860, 1734, 1688, 1585, 1251, 1007 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 7.47 (1H, s, H-19), 6.31 (1H, bs, H-17), 5.43 (1H, ddd, $J = 10.6, 10.2, 4.5$ Hz, H-12), 5.36 (1H, dddd, $J = 10.6, 9.6, 5.0, 1.3$ Hz, H-13), 5.30 (1H, dd, $J = 9.9, 2.0$ Hz, H-15), 4.16 (1H, ddd, $J = 11.2, 5.3, 2.8$ Hz, H-3), 3.73 (1H, ddd, $J = 3.9, 2.5, 2.3$ Hz, H-7), 3.12 (1H, dq, $J = 2.3, 6.9$ Hz, H-6), 2.92 (1H, d, $J = 2.5$ Hz, 7-OH), 2.91 (1H, d, $J = 5.3$ Hz, 7-OH), 2.66 (1H, ddd, $J = 15.1, 9.9, 9.6$ Hz, H-14a), 2.50 (1H, dd, $J = 15.4, 11.2$ Hz, H-2a), 2.43 (3H, s, H-21), 2.37 (1H, dd, $J = 15.4, 2.8$ Hz, H-2b), 2.23

(1H, m, H-14b), 2.18 (1H, m, H-11a), 2.01 (1H, m, H-11b), 2.08 (3H, d, $J = 1.3$ Hz, H-27), 1.74 (1H, m, H-8), 1.65 (1H, m, H-10a), 1.33 (1H, m, H-9a), 1.31 (3H, s, H-23), 1.19 (1H, m, H-10b), 1.18 (1H, m, H-9b), 1.17 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-24), 1.08 (3H, s, H-22), 0.99 (3H, d, $J = 7.1$ Hz, H-25); ^{13}C NMR, see Table 1; EIMS m/z 461 $[\text{M}]^+$ (6), 310 (5), 274 (10), 273 (7), 171 (63), 152 (100), 148 (18), 111 (15); HREIMS m/z 461.2743 (calcd. for $\text{C}_{26}\text{H}_{39}\text{NO}_6$, 461.2777).

Epothilone H₂ (13): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22} -44.4$ (c 0.25, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 203 (14500), 236 (12200); IR (KBr) ν_{max} 3436, 2967, 2935, 2880, 1734, 1690, 1586, 1251, 1007 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 7.46 (1H, s, H-19), 6.30 (1H, bs, H-17), 5.23 (1H, dd, $J = 9.8, 2.1$ Hz, H-15), 5.12 (1H, dd, $J = 10.1, 5.3$ Hz, H-13), 4.20 (1H, ddd, $J = 10.8, 5.7, 2.9$ Hz, H-3), 3.71 (1H, ddd, $J = 3.8, 2.6, 2.6$ Hz, H-7), 3.14 (1H, dq, $J = 2.6, 6.9$ Hz, H-6), 2.93 (d, $J = 5.7$ Hz, 3-OH), 2.90 (1H, bd, $J = 2.6$ Hz, 7-OH), 2.62 (1H, ddd, $J = 15.1, 9.8, 9.8$ Hz, H-14a), 2.46 (1H, dd, $J = 15.1, 10.8$ Hz, H-2a), 2.43 (3H, s, H-21), 2.32 (1H, dd, $J = 15.1, 2.9$ Hz, H-2b), 2.29 (1H, m, H-11a), 2.19 (1H, bd, $J = 15.1$ Hz, H-14b), 1.97 (3H, d, $J = 1.3$ Hz, H-27), 1.87 (1H, m, H-11b), 1.73 (1H, m, H-8), 1.67 (1H, m, H-10a), 1.65 (3H, bs, H-26), 1.32 (3H, s, H-23), 1.26 (2H, m, H-9), 1.24 (1H, m, H-10b), 1.18 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-24), 1.07 (3H, s, H-22), 1.00 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-25); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ 220.6 (s, C-5), 170.3 (s, C-1), 161.0 (s, C-20), 138.6 (s, C-12), 138.4 (s, C-16), 137.5 (s, C-18), 135.6 (d, C-19), 120.8 (d, C-13), 115.8 (d, C-17), 78.9 (d, C-15), 74.3 (d, C-7), 72.7 (d, C-3), 53.3 (s, C-4), 42.0 (d, C-6), 39.6 (t, C-2), 38.6 (d, C-8), 32.4 (t, C-14), 31.9 (t, C-9), 31.6 (t, C-11), 25.6 (t, C-10), 23.0 (q, C-26), 22.8 (q, C-23), 18.8 (q, C-22), 16.1 (q, C-27), 15.9 (q, C-25), 13.8 (q, C-21), 13.6 (q, C-24); EIMS m/z 475 $[\text{M}]^+$ (11), 288 (9), 287 (5), 188 (7), 171 (32), 152 (100),

111 (10); HREIMS m/z 475.2913 (calcd. for $C_{27}H_{41}NO_6$, 475.2934).

Epothilone C₁ (16): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -114.0 (c 10.0, MeOH); UV (MeOH) λ_{\max} nm (ϵ) 211 (16500), 248 (12500); IR (KBr) ν_{\max} 3440, 2933, 2877, 2858, 1730, 1708, 1457, 1244, 981 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ 6.96 (1H, s, H-19), 6.56 (1H, bs, H-17), 5.47 (1H, dd, $J = 9.2, 3.0$ Hz, H-15), 5.43 (1H, m, H-12), 5.40 (1H, m, H-13), 4.40 (1H, ddd, $J = 6.2, 6.1, 6.1$ Hz, H-3), 3.69 (1H, dd, $J = 5.7, 3.6$ Hz, H-7), 3.01 (1H, dq, $J = 5.7, 6.9$ Hz, H-6), 3.01 (1H, bs, 3-OH), 2.84 (1H, dq, $J = 5.2, 7.0$ Hz, H-4), 2.68 (3H, s, H-21), 2.66 (1H, ddd, $J = 16.4, 9.2, 7.3$ Hz, H-14a), 2.64 (1H, dd, $J = 15.9, 7.1$ Hz, H-2a), 2.54 (1H, dd, $J = 15.9, 6.1$ Hz, H-2b), 2.38 (1H, bd, $J = 16.4$ Hz, H-14b), 2.35 (1H, bs, 7-OH), 2.07 (3H, bs, H-27), 2.03 (2H, m, H-11), 1.62 (1H, m, H-10a), 1.53 (1H, m, H-8), 1.35 (1H, m, H-9a), 1.22 (1H, m, H-9b), 1.19 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-24), 1.14 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-23), 1.10 (1H, m, H-10b), 0.95 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-25); ^{13}C NMR, see Table 1; EIMS m/z 463 $[\text{M}]^+$ (5), 324 (8), 290 (8), 204 (7), 168 (100), 164 (15), 139 (36); HREIMS m/z 463.2381 (calcd. for $\text{C}_{25}\text{H}_{37}\text{NO}_5\text{S}$, 463.2392).

Epothilone D₁ (17): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -118.6 (c 0.5, MeOH); UV (MeOH) λ_{\max} nm (ϵ) 208 (18300), 249 (11900); IR (KBr) ν_{\max} 3439, 2965, 2934, 2877, 1729, 1707, 1456, 1250, 980 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ 6.98 (1H, s, H-19), 6.56 (1H, bs, H-17), 5.51 (1H, dd, J = 9.5, 3.4 Hz, H-15), 5.16 (1H, dd, J = 8.0, 4.2 Hz, H-13), 4.42 (1H, ddd, J = 7.1, 6.3, 5.5 Hz, H-3), 3.70 (1H, dd, J = 6.5, 2.9 Hz, H-7), 3.07 (1H, dq, J = 6.5, 6.9 Hz, H-6), 2.95 (1H, dq, J = 4.7, 7.0 Hz, H-4), 2.71 (3H, s, H-21), 2.69 (1H, dd, J = 16.0, 6.3 Hz, H-2a), 2.64 (1H, m, H-14a), 2.59 (1H, dd, J = 16.0, 7.1 Hz, H-2b), 2.46 (1H, bs, 3-OH), 2.38 (1H, bd, J = 16.0 Hz, H-14b), 2.19 (1H, ddd, J = 13.3, 8.6, 5.7 Hz, H-11a), 2.10 (3H, d, J = 1.4 Hz, H-27), 2.02 (1H, bs, 7-OH), 1.91 (1H, ddd, J = 13.3, 6.0, 6.0 Hz, H-11b), 1.68 (1H, m, H-10a), 1.66 (3H, bs, H-26), 1.53 (1H, m, H-8), 1.37 (1H, m, H-9a), 1.26 (1H, m, H-9b), 1.24 (3H, d, J = 6.9 Hz, H-24), 1.19 (1H, m, H-10b), 1.14 (3H, d, J = 7.0, H-23), 0.99 (3H, d, J = 6.9 Hz, H-25); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ 217.0 (s, C-5), 169.7 (s, C-1), 165.0 (s, C-20), 152.2 (s, C-18), 138.5 (s, C-12), 137.7 (s, C-16), 120.7 (d, C-13), 120.1 (d, C-17), 116.3 (d, C-19), 78.8 (d, C-15), 77.2 (d, C-7), 67.7 (d, C-3), 52.1 (d, C-4), 46.5 (d, C-6), 40.6 (t, C-2), 37.6 (d, C-8), 32.3 (t, C-14), 31.8 (t, C-11), 29.5 (t, C-9), 25.5 (t, C-10), 23.1 (q, C-26), 19.2 (q, C-21), 15.5 (q, C-27), 16.6 (q, C-25), 14.5 (q, C-24), 9.7 (q, C-23); EIMS m/z 477 $[\text{M}]^+$ (13), 304 (19), 303 (31), 218 (40), 204 (41), 163 (100), 164 (45), 157 (25), 139 (18); HREIMS m/z 477.2544 (calcd. for $\text{C}_{26}\text{H}_{39}\text{NO}_5\text{S}$, 477.2549).

Epothilone C₂ (18): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -11.6 (c 10.0, MeOH); UV (MeOH) λ_{\max} nm (ϵ) 212 (15500), 249 (12100); IR (KBr) ν_{\max} 3428, 2962, 2929, 2877, 2859, 1734, 1705, 1460, 1251, 982 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ 6.99 (1H, s, H-19), 6.66 (1H,

bs, H-17), 5.55 (1H, ddd, $J = 10.4, 9.2, 6.1$ Hz, H-12), 5.38 (1H, ddd, $J = 10.4, 9.3, 6.2$ Hz, H-13), 5.22 (1H, dd, $J = 8.8, 2.8$ Hz, H-15), 4.42 (1H, dddd, $J = 9.4, 5.6, 4.2, 4.1$ Hz, H-3), 3.93 (1H, d, $J = 5.6$ Hz, 3-OH), 3.86 (1H, m, H-7), 3.15 (1H, bs, 7-OH), 3.12 (1H, dq, $J = 4.2, 7.0$ Hz, H-4), 3.00 (1H, dq, $J = 6.9, 7.0$ Hz, H-6), 2.70 (3H, s, H-21), 2.62 (1H, dddd, $J = 15.1, 9.3, 8.8, 0.8$ Hz, H-14a), 2.58 (1H, dd, $J = 15.4, 9.4$ Hz, H-2a), 2.38 (1H, dd, $J = 15.4, 4.1$ Hz, H-2b), 2.31 (1H, ddd, $J = 15.1, 6.2, 2.8$ Hz, H-14b), 2.08 (3H, d, $J = 1.3$ Hz, H-27), 2.15 (1H, m, H-11a), 2.04 (1H, m, H-11b), 1.71 (1H, m, H-8), 1.59 (1H, m, H-10a), 1.43 (1H, m, H-9a), 1.31 (1H, m, H-9b), 1.26 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-24), 1.15 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-23), 1.11 (1H, m, H-10b), 1.00 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-25); ^{13}C NMR, see Table 1; EIMS m/z 463 $[\text{M}]^+$ (7), 324 (7), 306 (8), 290 (17), 168 (100), 164 (14), 139 (27); HREIMS m/z 463.2392 (calcd. for $\text{C}_{25}\text{H}_{37}\text{NO}_5\text{S}$, 463.2392).

Epothilone D₂ (19): colorless amorphous solid; $[\alpha]_{\text{D}}^{22} -12.5$ (c 1.0, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 210 (15400), 248 (11200); IR (KBr) ν_{max} 3436, 2965, 2930, 2877, 1732, 1705, 1458, 1253, 980 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 6.97 (1H, s, H-19), 6.56 (1H, bs, H-17), 5.18 (1H, dd, $J = 7.9, 4.9$ Hz, H-15), 5.18 (1H, ddd, $J = 9.6, 5.4, 1.0$ Hz, H-13), 4.27 (1H, m, H-3), 3.88 (1H, dd, $J = 5.6, 4.6$ Hz, H-7), 3.19 (1H, bs, 3-OH), 3.07 (1H, dq, $J = 4.3, 7.0$ Hz, H-4), 2.95 (1H, dq, $J = 5.6, 7.0$ Hz, H-6), 2.70 (3H, s, H-21), 2.62 (1H, dd, $J = 14.9, 7.8$ Hz, H-2a), 2.56 (1H, ddd, $J = 14.7, 9.6, 7.9$ Hz, H-14a), 2.43 (1H, dd, $J = 14.9, 5.6$ Hz, H-2b), 2.38 (1H, bs, 7-OH), 2.26 (1H, ddd, $J = 14.5, 5.4, 4.9$ Hz, H-14b), 2.19 (1H, ddd, $J = 13.0, 10.4, 5.4$ Hz, H-11a), 2.10 (3H, d, $J = 1.4$ Hz, H-27), 1.95 (1H, ddd, $J = 13.0, 10.3, 5.3$ Hz, H-11b), 1.72 (1H, m, H-8), 1.68 (3H, bs, H-26), 1.61 (1H, m, H-10a), 1.39 (2H, m, H-9), 1.21 (1H, m, H-10b).

1.19 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-24), 1.17 (3H, d, $J = 7.0$, H-22), 1.00 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-25); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ 216.8 (s, C-5), 170.4 (s, C-1), 164.9 (s, C-20), 152.3 (s, C-18), 139.8 (s, C-12), 137.5 (s, C-16), 120.5 (d, C-17), 119.2 (d, C-13), 116.3 (d, C-19), 80.0 (d, C-15), 74.3 (d, C-7), 69.7 (d, C-3), 48.6 (d, C-4), 48.4 (d, C-6), 39.9 (t, C-2), 36.6 (d, C-8), 32.2 (t, C-14), 32.7 (t, C-11), 30.9 (t, C-9), 26.0 (t, C-10), 23.6 (q, C-26), 19.2 (q, C-21), 15.4 (q, C-27), 17.1 (q, C-25), 12.4 (q, C-24), 12.7 (q, C-23); EIMS m/z 477 $[\text{M}]^+$ (22), 304 (19), 303 (17), 218 (22), 204 (25), 168 (100), 164 (28), 157 (31), 139 (21); HREIMS m/z 477.2545 (calcd. for $\text{C}_{26}\text{H}_{39}\text{NO}_3\text{S}$, 477.2549).

Epithilone C_3 (20): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22} -62.1$ (c 5.0, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 212 (16200), 248 (12300); IR (KBr) ν_{max} 3432, 2928, 2878, 2858, 1736, 1698, 1252, 1040 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ 6.95 (1H, s, H-19), 6.56 (1H, bs, H-17), 5.44 (1H, ddd, $J = 10.9, 10.3, 5.4$ Hz, H-12), 5.33 (1H, ddd, $J = 10.9, 9.3, 4.6$ Hz, H-13), 5.23 (1H, dd, $J = 9.5, 2.2$ Hz, H-15), 4.36 (1H, ddd, $J = 11.3, 5.6, 2.3$ Hz, H-3), 4.04 (1H, d, $J = 5.6$ Hz, 3-OH), 3.93 (1H, ddd, $J = 9.5, 2.3, 1.4$ Hz, H-7), 3.56 (1H, bd, $J = 2.3$ Hz, 7-OH), 2.70 (1H, dd, $J = 18.0, 1.4$ Hz, H-6a), 2.67 (3H, s, H-21), 2.61 (1H, ddd, $J = 15.3, 9.5, 9.3$ Hz, H-14a), 2.38 (1H, dd, $J = 14.3, 11.3$ Hz, H-2a), 2.36 (1H, dd, $J = 18.0, 9.5$ Hz, H-6b), 2.28 (1H, bd, $J = 15.3$ Hz, H-14b), 2.12 (1H, m, H-11a), 2.06 (1H, dd, $J = 14.3, 2.3$ Hz, H-2b), 2.03 (3H, d, $J = 1.3$ Hz, H-27), 1.96 (1H, m, H-11b), 1.75 (1H, m, H-8), 1.54 (1H, m, H-10a), 1.26 (1H, m, H-9a), 1.25 (3H, s, H-23), 1.17 (1H, m, H-10b), 1.15 (1H, m, H-9b), 1.03 (3H, s, H-22), 0.91 (3H, d, $J = 6.8$ Hz, H-25); ^{13}C NMR, see Table 1; EIMS m/z 463 $[\text{M}]^+$ (28), 290 (14), 168 (100), 164 (36), 157 (44), 151 (25); HREIMS m/z 463.2379 (calcd. for $\text{C}_{25}\text{H}_{37}\text{NO}_3\text{S}$, 463.2392).

Epothilone C₄ (21): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22} -75.6$ (c 1.0, MeOH); UV (MeOH) λ_{\max} nm (ϵ) 212 (17200), 248 (12500); IR (KBr) ν_{\max} 3434, 2974, 2932, 2859, 1735, 1686, 1252, 1046 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ 6.96 (1H, s, H-19), 6.60 (1H, bs, H-17), 5.43 (1H, m, H-12), 5.40 (1H, m, H-13), 5.26 (1H, dd, $J = 9.6, 2.3$ Hz, H-15), 4.41 (1H, ddd, $J = 11.4, 5.8, 2.5$ Hz, H-3), 3.78 (1H, m, H-7), 3.70 (1H, bs, 3-OH), 3.46 (1H, d, $J = 0.9$ Hz, 7-OH), 3.01 (1H, dq, $J = 0.5, 7.0$ Hz, H-6), 2.69 (3H, s, H-21), 2.66 (1H, ddd, $J = 15.3, 9.6, 8.8$ Hz, H-14a), 2.47 (1H, dd, $J = 14.5, 11.4$ Hz, H-2a), 2.29 (1H, m, H-14b), 2.25 (1H, dd, $J = 14.5, 2.5$ Hz, H-2b), 2.24 (1H, m, H-11a), 2.07 (3H, d, $J = 1.4$ Hz, H-27), 1.96 (1H, m, H-11b), 1.51 (2H, m, H-8), 1.44 (2H, m, H-10), 1.37 (2H, m, H-9), 1.32 (3H, s, H-23), 1.17 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-24), 1.07 (3H, s, H-22); ^{13}C NMR, see Table 1; EIMS m/z 463 $[\text{M}]^+$ (7), 276 (15), 171 (33), 168 (100), 164 (23), 151 (22), 111 (13); HREIMS m/z 463.2373 (calcd. for $\text{C}_{25}\text{H}_{37}\text{NO}_5\text{S}$, 463.2392).

Epothilone C₅ (22): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22} -158.2$ (c 0.5, MeOH); UV (MeOH) λ_{\max} nm (ϵ) 205 (19500), 247 (12700); IR (KBr) ν_{\max} 3447, 2972, 2927, 1737, 1690, 1450, 1252, 1181, 986 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 6.93 (1H, s, H-19), 6.48 (1H, bs, H-17), 5.48 (1H, ddd, $J = 10.7, 6.2, 6.2$ Hz, H-12), 5.39 (1H, m, H-13), 5.37 (1H, m, H-9), 5.34 (1H, dd, $J = 8.0, 2.3$ Hz, H-15), 4.29 (1H, dd, $J = 6.0, 2.6$ Hz, H-7), 4.09 (1H, ddd, $J = 10.8, 7.1, 2.9$ Hz, H-3), 3.59 (1H, d, $J = 7.1$ Hz, 3-OH), 3.17 (1H, dq, $J = 6.0, 6.9$ Hz, H-6), 2.68 (3H, s, H-21), 2.54 (1H, ddd, $J = 15.2, 8.1, 8.0$ Hz, H-14a), 2.44 (1H, bs, 7-OH), 2.42 (1H, dd, $J = 15.1, 2.9$ Hz, H-2a), 2.41 (1H, ddd, $J = 15.2, 2.3, 2.3$ Hz, H-14b), 2.34 (1H, dd, $J = 15.1, 10.8$ Hz, H-2b), 2.20 (1H, m, H-10a), 2.18 (2H, m, H-11), 2.12 (1H, m, H-10b), 2.06 (3H, bs, H-27), 1.67 (3H, bs, H-25), 1.27 (3H, s, H-23), 1.21 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-24), 1.15 (3H, s, H-22); ^{13}C NMR,

see Table 1; EIMS m/z 475 $[M]^+$ (6), 392 (7), 304 (6), 288 (33), 204 (76), 171 (19), 168 (100), 164 (12); HREIMS m/z 475.2380 (calcd. for $C_{26}H_{37}NO_5S$, 475.2392).

Epothilone D₅ (23): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -150 (*c* 0.2, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 205 (23300), 248 (13600); IR (KBr) ν_{max} 3439, 2967, 2927, 1736, 1690, 1451, 1254, 1181, 987 cm^{-1} ; 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 6.94 (1H, s, H-19), 6.51 (1H, bs, H-17), 5.34 (1H, bs, H-9), 5.29 (1H, dd, J = 8.0, 2.4 Hz, H-15), 5.16 (1H, dd, J = 8.2, 6.2 Hz, H-13), 4.30 (1H, bd, J = 4.9 Hz, H-7), 4.19 (1H, ddd, J = 10.8, 7.6, 3.0 Hz, H-3), 3.68 (1H, d, J = 7.6 Hz, 3-OH), 3.17 (1H, dq, J = 4.9, 7.0 Hz, H-6), 2.69 (3H, s, H-21), 2.65 (1H, d, J = 2.1 Hz, 7-OH), 2.56 (1H, ddd, J = 16.2, 8.2, 8.0 Hz, H-14a), 2.40 (1H, dd, J = 15.0, 3.0 Hz, H-2a), 2.39 (1H, bd, J = 16.2 Hz, H-14b), 2.34 (1H, dd, J = 15.0, 10.8 Hz, H-2b), 2.25 (2H, m, H-10a and H-11a), 2.20 (1H, m, H-10b), 2.17 (1H, m, H-11b), 2.05 (3H, d, J = 1.0 Hz, H-27), 1.69 (3H, bs, H-25), 1.68 (3H, bs, H-26), 1.29 (3H, s, H-23), 1.23 (3H, d, J = 7.0 Hz, H-24), 1.16 (3H, s, H-22); ^{13}C NMR, see Table 1; EIMS m/z 489 $[M]^+$ (4), 406 (4), 338 (7), 302 (13), 218 (35), 171 (10), 168 (100), 153 (20), 125 (10); HREIMS m/z 489.2536 (calcd. for $C_{27}H_{39}NO_5S$, 489.2549).

Epothilone C₆ (24): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -205.2 (*c* 1.0, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 218 (24600), 237 (28800); IR (KBr) ν_{max} 3435, 2967, 2927, 2882, 1732, 1688, 1465, 1258, 988 cm^{-1} ; 1H NMR ($CDCl_3$, 300 MHz) δ : 6.97 (1H, s, H-19), 6.58 (1H, bs, H-17), 6.43 (1H, dd, 15.5, 10.8 Hz, H-11), 6.11 (1H, dd, J = 10.8, 10.6 Hz, H-12), 5.75 (1H, ddd, J = 15.5, 8.3, 5.6 Hz, H-10), 5.34 (1H, m, H-13), 5.34 (1H, dd, J = 9.7, 2.4 Hz, H-15), 4.16 (1H, ddd, J = 9.2, 4.9, 4.3 Hz, H-3), 3.74 (1H, ddd, J = 2.2, 2.1, 1.7 Hz, H-7), 3.24 (1H, dq, J = 2.1, 6.9 Hz, H-6), 3.06 (1H, d, J = 2.2 Hz, 7-OH), 2.93 (1H, d, J = 4.9 Hz, 3-OH), 2.78 (1H, dddd,

$J = 14.1, 9.9, 9.7, 0.7$, H-14a), 2.71 (3H, s, H-21), 2.48 (1H, m, H-9a), 2.47 (1H, dd, $J = 15.5, 9.2$ Hz, H-2a), 2.40 (1H, dd, $J = 15.5, 4.3$ Hz, H-2b), 2.38 (1H, bdd, $J = 14.1, 7.8$ Hz, H-14b), 2.11 (3H, d, $J = 1.3$ Hz, H-27), 1.96 (1H, m, H-8), 1.33 (3H, s, H-23), 1.11 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-24), 1.06 (3H, s, H-22), 1.05 (3H, d, $J = 6.8$ Hz, H-25); ^{13}C NMR, see Table 1; EIMS m/z 475 $[\text{M}]^+$ (13), 387 (2), 316 (4), 288 (15), 230 (16), 204 (9), 171 (18), 168 (100), 164 (14), 151 (17); HREIMS m/z 475.2361 (calcd. for $\text{C}_{26}\text{H}_{37}\text{NO}_3\text{S}$, 475.2392).

Epothilone C₇ (25): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{25} -\text{XXX}$ (c 2.0, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) XXX (XXX), XXX (XXX); IR (KBr) ν_{max} XXX cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 7.01 (1H, s, H-19), 6.66 (1H, bs, H-17), 5.59 (1H, ddd, $J = 11.1, 11.1, 3.8$ Hz, H-12), 5.40 (1H, dd, $J = 11.1, 9.2$, H-13), 5.03 (1H, d, $J = 9.3$ Hz, H-15), 4.62 (1H, dd, $J = 9.3, 9.2$ Hz, H-14), 4.18 (1H, bd, $J = 11.0$ Hz, H-3), 3.72 (1H, bs, H-7), 3.20 (1H, bs, 3-OH), 3.09 (1H, dq, $J = 1.9, 6.8$ Hz, H-6), 3.00 (1H, bs, 7-OH), 2.69 (3H, s, H-21), 2.47 (1H, dd, $J = 14.8, 11.0$ Hz, H-2a), 2.32 (1H, dd, $J = 14.8, 2.6$ Hz, H-2b), 2.27 (1H, m, H-11a), 2.19 (3H, bs, H-27), 2.13 (1H, m, H-11b), 1.76 (1H, m, H-8), 1.70 (1H, m, H-10a), 1.35 (1H, m, H-9a), 1.32 (3H, s, H-23), 1.23 (1H, m, H-9b), 1.21 (1H, m, H-10b), 1.18 (3H, d, $J = 6.8$ Hz, H-24), 1.08 (3H, s, H-22), 1.00 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-25); EIMS m/z 493 $[\text{M}]^+$ XXX; HREIMS m/z 493.XXX (calcd. for $\text{C}_{26}\text{H}_{39}\text{NO}_6\text{S}$, 493.2498).

Epothilone C₈ (26): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{25} -75.2$ (c 2.5, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 210 (16800), 248 (17800); IR (KBr) ν_{max} 3443, 2932, 2881, 1734, 1689, 1465, 1255, 1183, 976 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ 6.93 (1H, s, H-19), 6.62 (1H, dd, $J = 15.6, 0.6$ Hz, H-17), 6.49 (1H, dd, $J = 15.6, 6.6$ Hz, H-16), 5.52 (1H, dddd, $J = 9.5, 6.6, 2.8, 0.6$ Hz, H-

15), 5.42 (1H, m, H-12), 5.41 (1H, m, H-13), 4.13 (1H, ddd, $J = 11.0, 5.3, 2.8$ Hz, H-3), 3.69 (1H, ddd, $J = 3.7, 2.8, 2.5$ Hz, H-7), 3.11 (1H, dq, $J = 2.5, 6.8$ Hz, H-6), 2.95 (1H, d, $J = 5.3$ Hz, 3-OH), 2.90 (1H, d, $J = 2.8$ Hz, 7-OH), 2.69 (3H, s, H-21), 2.67 (1H, ddd, $J = 14.9, 9.5, 8.4$ Hz, H-14a), 2.48 (1H, dd, $J = 15.6, 11.0$ Hz, H-2a), 2.33 (1H, dd, $J = 15.6, 2.8$ Hz, H-2b), 2.30 (1H, bd, $J = 14.9$ Hz, H-14b), 2.14 (1H, m, H-11a), 2.03 (1H, m, H-11b), 1.71 (1H, m, H-8), 1.63 (1H, m, H-10a), 1.31 (1H, m, H-9a), 1.29 (3H, s, H-23), 1.17 (3H, d, $J = 6.8$ Hz, H-24), 1.16 (1H, m, H-10b), 1.14 (1H, m, H-9b), 1.05 (3H, s, H-22), 0.97 (3H, d, $J = 7.1$ Hz, H-25); ^{13}C NMR, see Table 1; EIMS m/z 463 $[\text{M}]^+$ (21), 310 (10), 276 (21), 171 (83), 154 (100), 150 (27), 111 (18); HREIMS m/z 463.2382 (calcd. for $\text{C}_{25}\text{H}_{37}\text{NO}_3\text{S}$, 463.2392).

Epothilone C, (27): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{25} -93.4$ (c 1.0, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 209 (15200), 254 (15700); IR (KBr) ν_{max} 3416, 2966, 2932, 1736, 1689, 1463, 1249, 1011 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 7.06 (1H, s, H-19), 6.65 (1H, bs, H-17), 6.56 (1H, dd, $J = 10.6, 4.4$ Hz, 27-OH), 5.55 (1H, d, $J = 6.2$ Hz, 3-OH), 5.52 (1H, dd, $J = 11.6, 2.0$ Hz, H-15), 5.44 (1H, dddd, $J = 11.2, 10.7, 3.1, 1.7$ Hz, H-12), 5.35 (1H, dddd, $J = 11.0, 10.7, 3.9, 1.7$ Hz, H-13), 4.47 (1H, ddd, $J = 12.5, 4.4, 1.3$ Hz, H-27a), 4.35 (1H, ddd, $J = 11.7, 6.2, 2.6$ Hz, H-3), 4.20 (1H, ddd, $J = 12.5, 10.6, 0.9$ Hz, H-27b), 3.63 (1H, ddd, $J = 4.6, 1.8, 0.9$ Hz, H-7), 3.24 (1H, d, $J = 1.8$ Hz, 7-OH), 3.13 (1H, dq, $J = 0.9, 6.8$ Hz, H-6), 2.80 (1H, ddd, $J = 14.8, 11.6, 11.0$ Hz, H-14a), 2.71 (3H, s, H-21), 2.40 (1H, dd, $J = 14.4, 11.7$ Hz, H-2a), 2.24 (1H, m, H-11a), 2.06 (1H, dd, $J = 14.4, 2.6$ Hz, H-2b), 2.01 (1H, ddd, $J = 14.8, 3.9, 2.0$ Hz, H-14b), 2.00 (1H, m, H-11b), 1.77 (1H, m, H-8), 1.69 (1H, m, H-10a), 1.35 (1H, m, H-9a), 1.35 (3H, s, H-23), 1.19 (1H, m, H-10b), 1.19 (3H, d, $J = 6.8$ Hz, H-24), 1.18 (1H, m, H-9b), 1.01 (3H, d, $J =$

7.1 Hz, H-25), 0.98 (3H, s, H-22); ^{13}C NMR, see Table 1; EIMS m/z 493 $[\text{M}]^+$ (17), 306 (64), 184 (50), 171 (30), 167 (38), 166 (100), 138 (12); HREIMS m/z 493.2502 (calcd. for $\text{C}_{26}\text{H}_{39}\text{NO}_6\text{S}$, 493.2498).

trans-Epothilone C₁ (28): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -84 (*c* 0.2, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 211 (17400), 248 (12900); IR (KBr) ν_{max} 3433, 2961, 2933, 2879, 1730, 1708, 1457, 1251, 975 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ 7.00 (1H, s, H-19), 6.64 (1H, bs, H-17), 5.45 (1H, ddd, J = 15.2, 6.5, 6.5 Hz, H-12), 5.42 (1H, dd, J = 6.4, 3.7 Hz, H-15), 5.35 (1H, dt, J = 15.2, 7.1 Hz, H-13), 4.42 (1H, m, H-3), 3.58 (1H, ddd, J = 8.1, 7.9, 2.8 Hz, H-7), 3.24 (1H, m, H-6), 3.14 (1H, dq, J = 4.0, 6.9 Hz, H-6), 2.92 (1H, d, J = 7.9 Hz, 7-OH), 2.71 (3H, s, H-21), 2.71 (2H, m, H-2), 2.53 (2H, m, H-14), 2.17 (1H, d, J = 2.17 Hz, 3-OH), 2.11 (1H, m, H-11a), 2.06 (3H, bs, H-27), 1.93 (1H, m, H-11b), 1.68 (1H, m, H-9a), 1.65 (1H, m, H-10a), 1.33 (1H, m, H-8), 1.26 (3H, d, J = 6.8 Hz, H-24), 1.16 (1H, m, H-10b), 1.12 (3H, d, J = 6.9 Hz, H-22), 1.07 (1H, m, H-9b), 1.00 (3H, d, J = 6.8 Hz, H-25); ^{13}C NMR, see Table 1; EIMS m/z 463 $[\text{M}]^+$ (6), 290 (21), 289 (20), 204 (23), 194 (19), 190 (22), 168 (100), 164 (48), 157 (14), 152 (19), 151 (17), 139 (15), 111 (18); HREIMS m/z 463.2371 (calcd. for $\text{C}_{25}\text{H}_{37}\text{NO}_5\text{S}$, 463.2392).

trans-Epothilone C₂ (29): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -3 (*c* 1.5, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 211 (15800), 248 (11900); IR (KBr) ν_{max} 3435, 2963, 2931, 2878, 1731, 1706, 1457, 1273, 979 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ 6.99 (1H, s, H-19), 6.57 (1H, bs, H-17), 5.56 (1H, ddd, J = 15.1, 7.4, 7.0 Hz, H-12), 5.41 (1H, ddd, J = 15.1, 7.0, 6.9 Hz, H-13), 5.41 (1H, dd, J = 7.7, 2.8 Hz, H-15), 4.13 (1H, dddd, J = 6.7, 6.2, 5.6, 5.1 Hz, H-3), 3.78 (1H, ddd, J = 8.2, 6.5, 1.9 Hz, H-7), 3.18 (1H, d, J = 5.6 Hz, 3-OH), 3.06 (1H, dq, J = 8.2, 7.1 Hz,

H-6), 2.98 (1H, dq, $J = 6.2, 7.0$ Hz, H-4), 2.71 (3H, s, H-21), 2.64 (1H, dd, $J = 15.1, 6.7$ Hz, H-2a), 2.54 (1H, dd, $J = 15.1, 5.1$ Hz, H-2b), 2.44 (2H, m, H-14), 2.22 (1H, dddd, $J = 13.8, 7.0, 6.2, 2.9$ Hz, H-11a), 2.10 (3H, d, $J = 1.1$ Hz, H-27), 2.09 (1H, d, $J = 6.5$ Hz, 7-OH), 1.88 (1H, dddd, $J = 13.8, 10.9, 7.4, 2.9$ Hz, H-11b), 1.65 (1H, m, H-8), 1.63 (1H, m, H-10a), 1.56 (1H, dddd, $J = 12.7, 12.7, 3.9, 3.9$ Hz, H-9a), 1.20 (3H, d, $J = 7.1$ Hz, H-24), 1.15 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-23), 1.13 (1H, m, H-10b), 1.04 (1H, m, H-9b), 1.01 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-25); ^{13}C NMR, see Table 1; EIMS m/z 463 $[\text{M}]^+$ (13), 290 (11), 190 (10), 168 (100), 164 (20), 157 (26), 139 (17); HREIMS m/z 463.2383 (calcd. for $\text{C}_{25}\text{H}_{37}\text{NO}_5\text{S}$, 463.2392).

Epothilone I, (30): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{25}$ -XXX (*c* XXX, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) XXX; IR (KBr) ν_{max} XXX cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ 6.96 (1H, s, H-19), 6.54 (1H, bs, H-17), 5.49 (1H, ddd, $J = 10.3, 7.3, 7.3$ Hz, H-12), 5.33 (1H, dd, $J = 8.3, 4.4$ Hz, H-15), 5.31 (1H, m, H-13), 4.15 (1H, ddd, $J = 8.0, 5.0, 4.6$ Hz, H-3), 3.80 (1H, m, H-7), 3.21 (1H, dq, $J = 6.0, 6.9$ Hz, H-6), 2.89 (1H, d, $J = 5.0$ Hz, 3-OH); 2.70 (3H, s, H-21), 2.65 (1H, ddd, $J = 15.8, 8.5, 8.3$ Hz, H-14a), 2.42 (2H, m, H-2), 2.35 (1H, m, H-14b), 2.27 (1H, bd, $J = 3.3$ Hz, 7-OH), 2.13 (1H, m, H-11a), 2.09 (3H, d, $J = 1.2$ Hz, H-27), 2.00 (1H, m, H-11b), 1.72 (1H, m, H-8), 1.40 (2H, m, H-10_b), 1.37 (1H, m, H-9_a), 1.36 (2H, m, H-9_a), 1.32 (3H, s, H-23), 1.27 (3H, m, H-9_b and H-10_a), 1.13 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-24), 1.09 (3H, s, H-22), 0.94 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-25); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ 221.3 (s, C-5), 171.1 (s, C-1), 164.8 (s, C-20), 152.4 (s, C-18), 137.4 (s, C-16), 133.8 (d, C-12), 124.6 (d, C-13), 120.0 (d, C-17), 116.2 (d, C-19), 78.8 (d, C-15), 74.9 (d, C-7), 74.7 (d, C-3), 51.6 (s, C-4), 43.7 (d, C-6), 38.9 (t, C-2), 34.3 (d, C-8), 31.6 (t, C-14), 29.3 (t, C-9_a), 28.6 (t, C-10_b), 28.2 (t, C-10_a), 26.6 (t, C-

11), 24.8 (t, C-9_β), 23.6 (q, C-22), 19.3 (q, C-23), 19.3 (q, C-21), 16.5 (q, C-25), 15.5 (q, C-27), 13.7 (q, C-24); EIMS m/z 505 [M]⁺ XXX; HREIMS m/z 505.XXX (calcd. for C₂₈H₄₃NO₅S, 505.XXX).

Epothilone I₂ (31): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -XXX (c XXX, MeOH); UV (MeOH) λ_{\max} nm (ε) XXX; IR (KBr) ν_{\max} XXX cm⁻¹; ¹H NMR (CDCl₃, 300 MHz) δ 6.95 (1H, s, H-19), 6.53 (1H, bs, H-17), 5.40 (1H, m, H-12), 5.38 (1H, dd, J = 9.8, 3.3 Hz, H-15), 5.37 (1H, m, H-13), 4.21 (1H, ddd, J = 8.6, 3.8, 3.6 Hz, H-3), 3.85 (1H, ddd, J = 8.5, 5.8, 2.2 Hz, H-7), 3.18 (1H, dq, J = 8.5, 7.0 Hz, H-6), 2.70 (3H, s, H-21), 2.65 (1H, ddd, J = 15.2, 9.8, 9.0 Hz, H-14a), 2.51 (1H, d, J = 3.6 Hz, 3-OH), 2.37 (2H, m, H-2), 2.32 (1H, bd, J = 15.2 Hz, H-14b), 2.09 (3H, d, J = 1.3 Hz, H-27), 2.07 (2H, m, H-11), 1.78 (1H, m, H-8), 1.65 (1H, d, J = 5.8 Hz, 7-OH), 1.57 (1H, m, H-10_{βa}), 1.44 (1H, m, H-10_{αa}), 1.42 (1H, m, H-9_β), 1.32 (3H, s, H-23), 1.21 (1H, m, H-10_{βb}), 1.17 (3H, d, J = 7.0 Hz, H-24), 1.13 (2H, m, H-9_α), 1.06 (3H, s, H-22), 0.95 (3H, d, J = 7.0 Hz, H-25_α), 0.91 (3H, d, J = 6.5 Hz, H-25_β), 0.68 (1H, m, H-10_{αb}); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ 220.4 (s, C-5), 171.3 (s, C-1), XXX (s, C-20), 152.4 (s, C-18), 137.6 (s, C-16), 134.5 (d, C-12), 125.3 (d, C-13), 119.6 (d, C-17), 116.2 (d, C-19), 78.6 (d, C-15), 77.2 (d, C-7), 75.0 (d, C-3), 51.0 (s, C-4), 44.6 (d, C-6), 38.2 (t, C-2), 36.9 (t, C-9_α), 34.5 (t, C-10_α), 32.6 (d, C-8), 32.0 (t, C-14), 30.0 (d, C-9_β), 27.4 (t, C-11), 26.6 (t, C-10_β), 25.0 (q, C-22), 21.5 (q, C-25_β), 19.3 (q, C-21), 17.9 (q, C-25_α), 17.7 (q, C-23), 15.8 (q, C-24), 15.6 (q, C-27); EIMS m/z 519 [M]⁺ XXX; HREIMS m/z 519.XXX (calcd. for C₂₉H₄₅NO₅S, 519.XXX).

Epothilone I₃ (32): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -XXX (c XXX, MeOH); UV (MeOH) λ_{\max} nm (ε) XXX; IR (KBr) ν_{\max} XXX cm⁻¹; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ 6.95 (1H,

s, H-19), 6.52 (1H, bs, H-17), 5.32 (1H, dd, $J = 9.1, 3.0$ Hz, H-15), 5.08 (1H, dd, $J = 8.5, 3.9$ Hz, H-13), 4.13 (1H, ddd, $J = 9.4, 4.3, 3.2$ Hz, H-3), 3.81 (1H, m, H-7), 3.18 (1H, dq, $J = 6.8, 7.0$ Hz, H-6), 2.83 (1H, d, $J = 4.3$ Hz, 3-OH), 2.70 (3H, s, H-21), 2.61 (1H, ddd, $J = 15.8, 9.1, 8.5$ Hz, H-14a), 2.43 (1H, dd, $J = 14.0, 3.2$ Hz, H-2a), 2.38 (2H, dd, $J = 14.0, 9.4$ Hz, H-2b), 2.30 (1H, bd, $J = 15.8$ Hz, H-14b), 2.16 (1H, ddd, $J = 14.1, 8.3, 7.4$ Hz, H-11a), 2.08 (3H, d, $J = 1.0$ Hz, H-27), 1.99 (1H, d, $J = 4.7$ Hz, 7-OH), 1.92 (1H, ddd, $J = 14.1, 6.3, 6.3$ Hz, H-11b), 1.82 (1H, m, H-8), 1.67 (3H, s, H-26), 1.51 (1H, m, H-10_a), 1.40 (1H, m, H-9_b), 1.33 (1H, m, H-10_b), 1.31 (3H, s, H-23), 1.27 (1H, m, H-10_a), 1.23 (1H, m, H-9_a), 1.16 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-24), 1.10 (1H, m, H-9_b), 1.07 (3H, s, H-22), 0.95 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-25_a), 0.92 (3H, d, $J = 6.5$ Hz, H-25_b), 0.75 (1H, m, H-10_b); EIMS m/z 533 [M]⁺ XXX; HREIMS m/z 533.XXX (calcd. for C₃₀H₄₇NO₅S, 533.XXX).

Epothilone I₄ (33): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{25}$ -XXX (c XXX, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ε) XXX; IR (KBr) ν_{max} XXX cm⁻¹; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ 6.95 (1H, s, H-19), 6.53 (1H, bs, H-17), 5.47 (1H, dt, $J = 11.1, 5.8$ Hz, H-12), 5.33 (1H, ddd, $J = 9.2, 3.9, 0.5$ Hz, H-15), 5.33 (1H, m, H-13), 4.09 (1H, dddd, $J = 9.6, 8.1, 4.5, 3.3$ Hz, H-3), 3.83 (1H, m, H-7), 3.57 (1H, bs, 3-OH), 2.89 (1H, dq, $J = 7.4, 7.1$ Hz, H-6), 2.83 (1H, dq, $J = 8.1, 7.1$ Hz, H-4), 2.70 (3H, s, H-21), 2.64 (1H, m, H-14a), 2.42 (1H, dd, $J = 14.2, 3.3$ Hz, H-2a), 2.43 (1H, dd, $J = 14.2, 9.6$ Hz, H-2b), 2.30 (1H, m, H-14b), 2.10 (3H, d, $J = 1.3$ Hz, H-27), 2.09 (2H, m, H-11), 1.81 (1H, m, H-8), 1.74 (1H, bd, $J = 5.6$ Hz, 7-OH), 1.53 (1H, m, H-10_a), 1.49 (1H, m, H-9_b), 1.47 (1H, m, H-10_a), 1.27 (1H, m, H-10_b), 1.24 (1H, m, H-9_a), 1.17 (3H, d, $J = 7.1$ Hz, H-23), 1.14 (1H, m, H-9_b), 1.08 (3H, d, $J = 7.1$ Hz, H-24), 0.97 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-25_a),

0.91 (3H, d, $J = 6.5$ Hz, H-25_p), 0.79 (1H, m, H-10_ab); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ 217.0 (s, C-5), 170.8 (s, C-1), 164.8 (s, C-20), 152.4 (s, C-18), 137.1 (s, C-16), 134.6 (d, C-12), 124.7 (d, C-13), 120.2 (d, C-17), 116.4 (d, C-19), 78.7 (d, C-15), 76.4 (d, C-7), 71.3 (d, C-3), 50.7 (d, C-4), 50.1 (d, C-6), 40.7 (t, C-2), 38.5 (t, C-9_a), 35.5 (t, C-10_a), 33.4 (d, C-8), 31.8 (t, C-14), 30.0 (d, C-9_p), 27.2 (t, C-11), 26.7 (t, C-10_p), 21.4 (q, C-25_p), 19.3 (q, C-21), 18.2 (q, C-25_a), 15.4 (q, C-27), 14.4 (q, C-24), 13.1 (q, C-23); EIMS m/z 505 $[\text{M}]^+$ XXX; HREIMS m/z 505.XXX (calcd. for $\text{C}_{29}\text{H}_{43}\text{NO}_5\text{S}$, 505.XXX).

Epithilone I₅ (34): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -XXX (c XXX, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) XXX; IR (KBr) ν_{max} XXX cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 6.97 (1H, s, H-19), 6.52 (1H, bs, H-17), 5.32 (1H, dd, $J = 7.1, 6.2$ Hz, H-15), 5.03 (1H, dd, $J = 8.4, 5.0$ Hz, H-13), 4.05 (1H, dddd, $J = 7.5, 7.2, 5.9, 4.6$ Hz, H-3), 3.91 (1H, m, H-7), 3.17 (1H, d, $J = 5.9$ Hz, 3-OH), 2.94 (1H, dq, $J = 7.2, 7.1$ Hz, H-4), 2.87 (1H, dq, $J = 6.5, 6.9$ Hz, H-6), 2.70 (3H, s, H-21), 2.62 (1H, dd, $J = 14.6, 4.6$ Hz, H-2a), 2.60 (1H, m, H-14a), 2.53 (1H, dd, $J = 14.6, 7.5$ Hz, H-2b), 2.31 (1H, m, H-14b), 2.10 (3H, d, $J = 1.1$ Hz, H-27), 2.10 (1H, m, H-11a), 2.02 (1H, m, H-11b), 1.97 (1H, bd, $J = 5.6$ Hz, 7-OH), 1.84 (1H, m, H-8), 1.66 (3H, s, H-26), 1.55 (1H, m, H-9_p), 1.49 (1H, m, H-10_pa), 1.39 (1H, m, H-10_pb), 1.33 (1H, m, H-10_a), 1.31 (1H, m, H-9_aa), 1.15 (3H, d, $J = 7.1$ Hz, H-23), 1.12 (1H, m, H-9_ab), 1.11 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-24), 0.97 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-25_a), 0.94 (1H, m, H-10_ab), 0.93 (3H, d, $J = 6.6$ Hz, H-25_p); EIMS m/z 519 $[\text{M}]^+$ XXX; HREIMS m/z 519.XXX (calcd. for $\text{C}_{29}\text{H}_{45}\text{NO}_5\text{S}$, 519.XXX).

Epithilone I₆ (35): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22}$ -XXX (c XXX, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) XXX; IR (KBr) ν_{max} XXX cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 6.97 (1H,

s, H-19), 6.52 (1H, bs, H-17), 5.24 (1H, dd, $J = 6.9, 6.9$ Hz, H-15), 5.02 (1H, dd, $J = 8.8, 5.2$ Hz, H-13), 4.22 (1H, tdd, $J = 6.1, 5.6, 4.8$ Hz, H-3), 3.76 (1H, ddd, $J = 6.1, 5.7, 5.6$ Hz, H-7), 3.13 (1H, d, $J = 5.6$ Hz, 3-OH), 3.05 (1H, dq, $J = 4.8, 7.0$ Hz, H-4), 2.79 (1H, dq, $J = 5.6, 6.9$ Hz, H-6), 2.70 (3H, s, H-21), 2.62 (1H, m, H-14a), 2.57 (2H, d, $J = 6.1$ Hz, H-2a), 2.30 (1H, m, H-14b), 2.08 (3H, d, $J = 1.0$ Hz, H-27), 2.02 (2H, m, H-11), 1.73 (1H, d, $J = 6.1$ Hz, 7-OH), 1.69 (1H, m, H-8), 1.66 (3H, s, H-26), XXX (H-9_α, H-9_β, H-10_α, H-10_β), 1.21 (3H, d, $J = 7.0$ Hz, H-22), 1.16 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-24), 0.94 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-25_α), 0.91 (3H, d, $J = 6.4$ Hz, H-25_β); EIMS m/z 519 [M]⁺ XXX; HREIMS m/z 519.XXX (calcd. for C₂₉H₄₅NO₅S, 519.XXX).

Epothilone K (36): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22} -7$ (c 0.08, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 212 (16700), 248 (12500); IR (KBr) ν_{max} 3431, 2963, 2927, 2856, 1731, 1712, 1262, 1093, 1021, 802 cm⁻¹; ¹H NMR (CDCl₃, 300 MHz) δ 6.95 (1H, s, H-19), 6.51 (1H, bs, H-17), 5.49 (3H, m, H-15, H-13, and H-12), 4.04 (1H, dddd, $J = 7.9, 7.6, 6.9, 3.3$ Hz, H-3), 3.36 (1H, dq, $J = 6.9, 6.8$ Hz, H-6), 2.83 (1H, d, $J = 7.6$ Hz, 3-OH), 2.75 (1H, ddd, $J = 16.1, 6.6, 3.4$ Hz, H-14a), 2.74 (1H, dd, $J = 15.3, 3.3$ Hz, H-2a), 2.71 (3H, s, H-21), 2.58 (2H, m, H-14b and H-8), 2.50 (1H, dd, $J = 15.3, 7.9$ Hz, H-2b), 2.29 (1H, m, H-11a), 2.10 (1H, m, H-11b), 2.09 (3H, d, $J = 0.7$ Hz, H-27), 1.78 (1H, m, H-9a), 1.65 (1H, m, H-10a), 1.48 (1H, m, H-10b), 1.18 (1H, m, H-9b), 1.15 (3H, d, $J = 6.8$ Hz, H-22), 1.03 (3H, d, $J = 6.5$ Hz, H-25); EIMS m/z 405 [M]⁺ (38), 317 (12), 260 (9), 232 (10), 204 (14), 190 (16), 168 (100), 164 (30), 151 (28); HREIMS m/z 405.XXX (calcd. for C₂₆H₃₉NO₅S, 405.XXX).

(37): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{22} -27.5$ (c 0.4, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ)

211 (16100), 247 (12100); IR (KBr) ν_{\max} 3431, 2967, 2929, 2875, 1704, 1462, 1381, 1010 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 6.94 (1H, s, H-19), 6.55 (1H, bs, H-17), 5.56 (1H, dtt, $J = 10.8$, 7.3, 1.4 Hz, H-12), 5.39 (1H, dtt, $J = 10.8$, 7.3, 1.4 Hz, H-13), 4.17 (1H, t, $J = 6.6$ Hz, H-15), 3.50 (1H, ddd, $J = 8.7$, 2.6, 2.6 Hz, H-7), 3.10 (1H, d, $J = 2.6$, 7-OH), 2.90 (1H, dq, $J = 2.6$, 7.2 Hz, H-6), 2.77 (1H, sep, $J = 6.9$ Hz, H-4), 2.70 (3H, s, H-21), 2.40 (2H, m, H-14), 2.07 (2H, m, H-11), 2.04 (3H, d, $J = 1.1$ Hz, H-27), 1.78 (1H, bs, 15-OH), 1.74 (1H, m, H-9a), 1.50 (1H, m, H-8), 1.46 (1H, m, H-10a), 1.27 (1H, m, H-10b), 1.11 (1H, m, H-9b), 1.094 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-23), 1.089 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-22), 1.08 (3H, d, $J = 7.2$ Hz, H-24), 0.82 (3H, d, $J = 6.7$ Hz, H-25); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ 220.5 (s, C-5), 164.6 (s, C-20), 152.9 (s, C-18), 141.5 (s, C-16), 133.4 (d, C-12), 125.0 (d, C-13), 119.2 (d, C-17), 115.6 (d, C-19), 77.2 (d, C-15), 74.9 (d, C-7), 44.9 (d, C-6), 40.0 (d, C-4), 35.5 (d, C-8), 33.5 (t, C-14), 32.3 (t, C-9), 27.9 (t, C-11), 26.9 (t, C-10), 19.2 (q, C-21), 18.6 (q, C-23), 18.1 (q, C-22), 15.6 (q, C-25), 14.4 (q, C-27), 9.3 (q, C-24); EIMS m/z 407 $[\text{M}]^+$ (0.1), 204 (0.8), 168 (100), 140 (3.4); HREIMS m/z 407.XXX (calcd. for $\text{C}_{23}\text{H}_{37}\text{NO}_3\text{S}$, 407.XXX).

(38): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{25} +25.0$ (c 0.5, MeOH); UV (MeOH) λ_{\max} nm (ϵ) 212 (17700), 247 (13400); IR (KBr) ν_{\max} 3427, 2971, 2933, 2878, 2858, 1709, 1457, 1377, 1186, 1023 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ 6.95 (1H, s, H-19), 6.55 (1H, bs, H-17), 5.52 (1H, dtt, $J = 10.9$, 7.2, 1.4 Hz, H-12), 5.39 (1H, dtt, $J = 10.9$, 7.1, 1.2 Hz, H-13), 4.18 (1H, ddt, $J = 3.4$, 0.4, 6.7 Hz, H-15), 2.71 (3H, s, H-21), 2.51 (1H, bq, $J = 6.8$ Hz, H-8), 2.48 (1H, dq, $J = 17.7$, 7.4 Hz, H-6a), 2.41 (1H, dq, $J = 17.7$, 7.2 Hz, H-6b), 2.39 (2H, ddd, $J = 7.1$, 6.7, 1.4 Hz, H-14), 2.06 (2H, ddt, 7.2, 1.2, 7.0 Hz, H-11), 2.05 (3H, d, $J = 1.4$ Hz, H-27), 1.81 (1H, d, $J = 3.4$ Hz,

15-OH), 1.66 (1H, m, H-9a), 1.32 (1H, m, H-9b), 1.31 (2H, m, H-10), 1.06 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-25), 1.04 (3H, dd, $J = 7.4, 7.2$ Hz, H-24); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ 215.3 (s, C-7), 164.6 (s, C-20), 152.9 (s, C-18), 141.5 (s, C-16), 132.7 (d, C-12), 125.3 (d, C-13), 119.2 (d, C-17), 115.6 (d, C-19), 77.2 (d, C-15), 46.0 (d, C-8), 34.3 (t, C-14), 33.5 (t, C-6), 32.7 (t, C-9), 27.5 (t, C-11), 27.3 (t, C-10), 19.2 (q, C-21), 16.5 (q, C-25), 14.4 (q, C-27), 7.8 (q, C-24); EIMS m/z 335 $[\text{M}]^+$ (2), 317 (4), 170 (27), 169 (67), 168 (100), 140 (20); HREIMS m/z 335.1912 (calcd. for $\text{C}_{19}\text{H}_{29}\text{NO}_2\text{S}$, 335.1919).

(39): colorless amorphous solid; $[\alpha]_D^{25} +26.4$ (c 0.27, MeOH); UV (MeOH) λ_{max} nm (ϵ) 203 (19100), 244 (12500); IR (KBr) ν_{max} 3430, 2970, 2934, 2877, 1710, 1458, 1377, 1184 cm^{-1} ; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ 6.94 (1H, s, H-19), 6.55 (1H, bs, H-17), 5.17 (1H, t, $J = 7.3$ Hz, H-13), 4.13 (1H, m, H-15), 2.70 (3H, s, H-21), 2.51 (1H, bq, $J = 6.8$ Hz, H-8), 2.47 (1H, dq, $J = 17.7, 7.2$ Hz, H-6a), 2.41 (1H, dq, $J = 17.7, 7.2$ Hz, H-6b), 2.33 (2H, bdd, $J = 7.3, 6.8$ Hz, H-14), 2.05 (3H, d, $J = 1.2$ Hz, H-27), 2.03 (2H, m, H-11), 1.71 (1H, d, $J = 3.2$ Hz, 15-OH), 1.69 (3H, d, $J = 1.3$ Hz, H-26), 1.62 (1H, m, H-9a), 1.32 (3H, m, H-10 and H-9b), 1.06 (3H, d, $J = 6.9$ Hz, H-25), 1.03 (3H, t, $J = 7.2$ Hz, H-24); EIMS m/z 349 $[\text{M}]^+$ (0.7), 331 (1.7), 168 (100), 140 (5.1); HREIMS m/z 349.XXX (calcd. for $\text{C}_{20}\text{H}_{31}\text{NO}_2\text{S}$, 349.XXX).


Tab 1. Aktivität von Epothilonen und Verbindungen (1) bis (39) gegen Maus-Fibroblasten (L929, IC50 /ng/ml/)

Struktur- typ	Epothilone				
	A _γ	B _γ	C _γ	D _γ	trans C _γ
Ausgangs- epothilon	(1) 4	(2) 1-2	(14) 50-100	(15) 20	-
21-Hydroxy (E&F)	(3) 10	(4) 1.5	-	-	-
Oxazoles (G&H)	(10) 6	(11) 1	(12) 120	(13) 11	-
(R)-4-Desmethyl (X ₁)	(5) 20	-	(16) 200	(17) 20	(28) 400
(S)-4-Desmethyl (X ₂)	(6) 7	-	(18) 25-30	(19) 12	(29) 80
6-Desmethyl (X ₃)	-	-	(20) 1500	-	-
8-Desmethyl (X ₄)	-	-	(21) 800	-	-
8,9-Dehydro (X ₅)	-	-	(22) 1500	(23) 200	-
10,11-Dehydro (X ₆)	-	-	(24) 120	-	-
14-Hydroxy (X ₇)	-	-	(25)	-	-
16-Desmethyl (X ₈)	(7) 20	-	(26) 250	-	-
27-Hydroxy (X ₉)	(8) 100	-	(27) 200	-	-
21-Methyl (X ₁₀)	-	(9) 1.5	-	-	-
Verbindung	-	-	(36) 180	-	-
Verbindung	-	-	(37) 50	-	-
Verbindung	-	-	(38) 2000	(39) 500	-

Epothilon-Nebenkomponenten

Patentansprüche

1. Epothilon der Formel




Epothilone A₁ (5) R¹ = H; R², R⁸ = Me

Epothilone A₂ (6) R² = H; R¹, R⁸ = Me

Epothilone A₈ (7) R⁸ = H; R¹, R² = Me oder


Epothilone A₉ (8) R¹ = CH₂OH; R², R⁸ = Me

2. Epothilon der Formel



Epothilone B₁₀ (9)


3. Epothilon der Formel



- ✓ Epothilone G₁ (10) R = H
 ✓ Epothilone G₂ (11) R = Me

oder


4. Epothilon der Formel



- ✓ Epothilone H₁ (12) R = H
 ✓ Epothilone H₂ (13) R = Me

oder


5. Epothilon der Formel



- ✓ Epothilone C₁ (16) R¹ = H; R², R³, R⁴ = Me; R = H
 ✓ Epothilone D₁ (17) R¹ = H; R², R³, R⁴ = Me; R = Me
 ✓ Epothilone C₂ (18) R² = H; R¹, R³, R⁴ = Me; R = H
 ✓ Epothilone D₂ (19) R² = H; R¹, R³, R⁴ = Me; R = Me
 ✓ Epothilone C₃ (20) R³ = H; R¹, R², R⁴ = Me; R = H
 ✓ Epothilone C₄ (21) R⁴ = H; R¹, R², R³ = Me; R = H


oder

6. Epothilon der Formel


Epothilone C₅ (22) R = HEpothilone D₅ (23) R = Me

oder

7. Epothilon der Formel


✓ Epothilone C₆ (24)

8. Epothilin der Formel

✓ Epothilone C₇ (25) R⁷ = OH; R⁸ = Me✓ Epothilone C₈ (26) R⁸, R⁷ = H✓ Epothilone C₉ (27) R⁸ = CH₂OH; R⁷ = H


oder

9. Epothilon der Formel


✓ trans-Epothilone C₁ (28) R¹ = H; R² = Me✓ trans-Epothilone C₂ (29) R² = H; R¹ = Me

oder

10. Epothilon der Formel


Epothilone I₁ (30) R, R³ = H; R¹, R² = MeEpothilone I₂ (31) R = H; R¹, R², R³ = MeEpothilone I₃ (32) R¹, R², R³, R = MeEpothilone I₄ (33) R², R = H; R¹, R³ = MeEpothilone I₅ (34) R² = H; R¹, R³, R = Me oderEpothilone I₆ (35) R¹ = H; R², R³, R = Me

11. Epothilon der Formel




✓ Epothilone K (36)

12. Verbindung der Formel



(37)

13. Verbindung der Formel




(38) R = H

(39) R = Me
32

oder

1/2

Fig. 1



2/2

Fig. 2

fraction 1	1.1	Epothilone E (3)	variable ^a
		Epothilone F (4)	variable ^a
		Epothilone A ₂ (6)	14.5 mg
		Epothilone A ₁ (5)	3.1 mg
		Epothilone G ₁ (10)	62.3 mg
	1.2	Epothilone C ₇ (25)	0.9 mg
		Epothilone A ₈ (7)	38.7 mg
	1.3	Epothilone A ₉ (8)	4.4 mg
		Epothilone G ₂ (11)	9.4 mg
		Epothilone A (1)	29800.0 mg
fraction 2	2.1	Epothilone B (2)	10300.0 mg
		Epothilone C ₁ (16)	32.4 mg
	2.2	Epothilone B ₁₀ (9)	1.1 mg
		Epothilone C ₂ (18)	58.4 mg
	2.3	Epothilone D ₁ (17)	5.3 mg
		trans-Epothilone C ₁ (28)	1.4 mg
		trans-Epothilone C ₂ (29)	4.5 mg
		38	6.5 mg
		Epothilone H ₁ (12)	3.0 mg
		Epothilone C ₈ (22)	7.3 mg
	2.4	37	2.9 mg
		Epothilone C ₃ (20)	32.5 mg
		Epothilone C ₉ (26)	26.3 mg
		Epothilone D ₂ (19)	13.1 mg
	2.5	Epothilone K (36)	0.4 mg
		Epothilone C ₅ (24)	2.9 mg
		Epothilone C ₄ (21)	6.5 mg
	2.6	39	0.8 mg
		Epothilone H ₂ (13)	1.5 mg
		Epothilone D ₃ (23)	0.9 mg
		Epothilone C ₆ (27)	3.0 mg
		Epothilone C (14)	4600.0 mg
		Epothilone D (15)	2700.0 mg